

AMZV**O que é ospolot e quando é usado?**

O Ospolot reduz ou reduz as convulsões em crianças que sofrem da chamada epilepsia de Rolando. A epilepsia de Rolando também é conhecida como epilepsia benigna da infância com descargas centrotemporais.

Ospolot só está disponível mediante receita médica.

Quando o Ospolot não deve ser usado?

Ospolot não deve ser tomado se você for hipersensível ao ingrediente ativo Sultiam, ingredientes ativos semelhantes (sulfonamidas) ou outros ingredientes do medicamento.

Em certas doenças, como

- Doença da tireoide
- Doença da função renal
- Doença da mente (doenças mentais e emocionais)
- Distúrbio na formação do sangue

Ospolot não deve ser tomado.

Ospolot não deve ser usado durante a gravidez/amamentação. Além disso, o Ospolot é contraindicado em mulheres em idade fértil e em adolescentes do sexo feminino com idade igual ou superior a 12 anos.

Quando deve ter cuidado ao tomar Ospolot?

Quando o Ospolot é combinado com vários outros medicamentos, o efeito do Ospolot ou dos outros medicamentos pode ser alterado. Portanto, é essencial seguir as instruções de dosagem do seu médico.

Durante o tratamento com Sultiam, o consumo de álcool deve ser evitado, pois pode deixá-lo muito enjoado.

Fale com o seu médico ou profissional de saúde imediatamente, ou certifique-se de que outra pessoa pode fazer isso por si ou pelo seu filho, se ocorrer algum dos seguintes efeitos secundários (pouco frequentes ou raros): febre, dor de garganta, erupção cutânea, úlceras na boca, glândulas inchadas, escurecimento da urina, sinais de reações cutâneas graves, tais como descamação da pele.

Estes podem ser sinais precoces de danos graves ao sangue, rins ou outros órgãos e podem exigir atenção médica urgente. Por conseguinte, o seu médico irá monitorizá-lo periodicamente a si ou ao seu médico. Examine seu filho em busca de sangue e urina.

Este medicamento pode afetar a capacidade de resposta, a capacidade de usar ferramentas ou máquinas e a capacidade de dirigir! Informe o seu médico, farmacêutico ou farmacêutico. O seu médico, farmacêutico, se você ou Seu filho

- sofrem de outras doenças,
- Tem alergias ou
- tomar outros medicamentos (incluindo os auto-comprados!) ou usá-los externamente (externa)!

Um pequeno número de pacientes tratados com medicamentos antiepilépticos, como o Sultiam, teve pensamentos de automutilação ou de tirar a própria vida. Se a qualquer momento você tiver esses pensamentos, entre em contato com seu médico imediatamente.

O Ospolot pode ser tomado durante a gravidez ou amamentação?

Ospolot não deve ser usado durante a gravidez e amamentação.

Como você usa o Ospolot?

Não altere a dosagem prescrita por conta própria. Se achar que o medicamento é demasiado fraco ou demasiado forte, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Ospolot só deve ser tomado sob supervisão médica. Seu médico ou O seu médico irá adaptar a dose exatamente às suas necessidades pessoais ou às necessidades do seu filho. Em determinadas circunstâncias, iniciará gradualmente o tratamento com Ospolot com uma dose inicial baixa, dependendo do tipo e gravidade da doença, e depois aumentará lentamente a dose até que a dose de manutenção efetiva seja atingida. Em outras condições, seu médico ou O seu médico pode iniciar o tratamento com Ospolot imediatamente com a dose de manutenção eficaz. A dose diária deve ser dividida em três doses individuais, se possível.

É muito importante que você siga exatamente as instruções do seu médico e que o Ospolot seja tomado regularmente. Se você esquecer de tomar Ospolot, não compense com uma dose dupla da próxima vez. Continue o tratamento na dose prescrita. Se for esquecida mais do que uma dose, consulte o seu médico.

Você pode ou Seu filho pode engolir comprimidos revestidos por película de Ospolot com bastante líquido (1 copo de água). Os comprimidos revestidos por película de 200 mg cada são fornecidos com um sulco de fratura e podem ser divididos.

A duração da ingestão depende do tipo e gravidade da doença e da reação individual. É determinado pelo médico assistente.

Quais são os efeitos colaterais do Ospolot?

Os seguintes efeitos colaterais podem ocorrer ao tomar Ospolot:

Muitas vezes (mais de 1 pessoa em cada 10) podem ocorrer problemas de estômago.

Especialmente no início do tratamento, muitas vezes podem ocorrer dificuldades respiratórias até falta de ar, formigamento nos braços, pernas ou rosto, tontura, dor de cabeça, náusea, vômito ou fadiga (1 a 10 pessoas em 100). Alguns pacientes podem sentir confusão e inquietação.

Além disso, ocasionalmente (1 a 10 pessoas em 1.000) pode ocorrer uma sensação de aperto no peito, palpitações, perda de apetite, alucinações, ansiedade, falta de motivação.

Raramente (1 a 10 pessoas em 10.000) ocorrem reações alérgicas na pele; em casos individuais de forma grave (síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Lyell). Muito raramente (menos de 1 pessoa em 10.000) há uma redução nos glóbulos brancos, plaquetas, impotência, aumento ou diminuição da pressão arterial, um distúrbio da função renal ou inflamação de vários nervos. Muito raramente, pode ocorrer acidose metabólica (excesso de substâncias ácidas no sangue). Os primeiros sinais dessa acidose metabólica são aumento da respiração, fadiga e

Anorexia.

Em casos individuais, podem ocorrer problemas comportamentais como agressividade, irritabilidade, alterações de humor.

O médico deve ser consultado imediatamente se ocorrer febre, dor de garganta, sintomas semelhantes aos da gripe, descamação da pele, bolhas na pele ou dificuldade para urinar. Isso pode indicar um efeito colateral grave (danos ao sangue, rins ou outros órgãos) e deve ser esclarecido imediatamente.

Se detetar quaisquer efeitos secundários não descritos aqui, deve contactar o seu médico ou farmacêutico. Informe o seu médico ou farmacêutico.

O que mais deve ser considerado?

O medicamento só deve ser utilizado até à data marcada no recipiente com a etiqueta "Utilizável por". Conservar na embalagem original à temperatura ambiente (15 – 25 °C) e fora do alcance das crianças.

Para mais informações, contacte o seu médico, farmacêutico ou Seu médico, farmacêutico. Essas pessoas têm as informações especializadas detalhadas.

O que está contido no Ospolot?

1 comprimido revestido por película de Ospolot 200 mg: contém 200 mg de Sultiam como ingrediente ativo e excipientes para a produção do comprimido revestido por película. 1 comprimido revestido por película de Ospolot 50 mg: contém 50 mg de Sultiam como ingrediente ativo e excipientes para a produção do comprimido revestido por película.

Número da licença

55603 (Swissmedic)

Onde você pode obter Ospolot? Quais pacotes estão disponíveis?

Nas farmácias apenas com receita médica.

Tamanhos de embalagem:

Ospolot 200 mg comprimidos revestidos por película divisível (com ranhura de fratura): 50 Ospolot 50 mg comprimidos revestidos por película: 50

Zulassungsinhaberin

Desitin Pharma
GmbH 4410 Liestal
Suíça

Este folheto informativo foi revisto pela última vez pela Agência de Medicamentos (Swissmedic) em julho de 2014.

18226 / 21.04.2015